

Микоплазмоз у кошек: передаётся ли он человеку

Мycoplasma у кошек — это заболевание, вызываемое микроорганизмами Mycoplasma, которая может проявляться в виде разных симптомов: от незначительного воспаления глаз до тяжёлых поражений дыхательной и мочевыделительной систем. Многие владельцы, столкнувшись с подобным диагнозом, сразу задаются вопросом: не грозит ли инфекция человеку? В этой статье постараемся спокойно и последовательно разобрать, что представляет собой микоплазмоз, какие микроорганизмы этой группы бывают у кошек и как снизить риски для людей в доме.

Важно понимать, что не всякая микоплазма одинаково опасна. Некоторые возбудители обитает на слизистых как условно-патогенная флора, другие же вызывают заметное заболевание. Когда речь идёт о заражении человека, ключевое значение имеют конкретный вид микоплазмы, состояние иммунной системы и пути передачи. Об этом и поговорим дальше, чтобы вы могли действовать без излишней тревоги.

Микоплазмоз кошек: общее представление

Микоплазмы — это мельчайшие микроорганизмы, которые по размеру ближе к вирусам, но по строению похожи на бактерии. У них отсутствует жёсткая клеточная стенка, из-за чего они могут легко деформироваться и нуждаются в особых питательных средах. У кошек наиболее часто обнаруживают такие виды, как Mycoplasma felis и Mycoplasma gatae. Эти микроорганизмы могут быть частью обычной микрофлоры дыхательных путей и слизистой глаз, но при снижении иммунитета могут становиться причиной развития воспаления.

Передача инфекции между кошками обычно реализуется через воздух либо при прямом контакте: во время чихания, использования общих мисок, груминге. Существует мнение, что микоплазмы могут передаваться и при половых контактах между кошками, однако это подтверждается не во всех случаях. Для человека наибольший интерес представляет разобраться, может ли бытовая кошка оказаться источником заражения.

Передаётся ли микоплазмоз от кошки человеку

Главное, что нужно знать: кошачьи виды микоплазм, в частности Mycoplasma felis и Mycoplasma gatae, не относятся к типичным возбудителям заболеваний человека. Иными словами, что при обычном контакте с больной кошкой, вероятность заражения для человека со здоровым иммунитетом оценивается как невысокая. Однако это не значит, что ситуация абсолютно безопасна: людям с ослабленной иммунной системой, маленьким детям и тем, кто проходит иммуносупрессивную терапию следует соблюдать повышенную осторожность.

Значительная часть микоплазм видоспецифичны, то есть приспособлены к конкретному хозяину. Кошачьи штаммы, обычно не приживаются в организме человека. Тем не менее в медицинской литературе описаны отдельные случаи, когда микоплазмы обнаруживали у людей с выраженными иммунодефицитными состояниями, но это скорее исключение, чем закономерность. Возбудители, вызывающие пневмонию или урогенитальные инфекции у человека, как правило, имеют иную природу и не связаны напрямую с кошачьим микоплазмозом.

Группа людей	Риск при контакте с больной кошкой	Что делать
Взрослые без хронических болезней	Низкий	Соблюдать обычную гигиену
Маленькие дети	Низкий, однако требует	

внимания]Ограничить тесный контакт с выделениямиПациенты с ослабленным иммунитетомПовышенныйПроконсультироваться со специалистомБудущие мамыНевысокийМыть руки после ухода за кошкой

Итак, прямая угроза для большинства людей невелика, но полностью отвергать вероятность передачи нельзя, особенно если в семье есть люди с ослабленным здоровьем. Разумный подход заключается в том, чтобы не впадать в панику, но придерживаться простых профилактических мер.

Как микоплазмоз проявляется у кошек

Проявления болезни может быть разной и зависит от того, какая система вовлечена. Наиболее часто хозяева отмечают следующие признаки: выделения из глаз, частое чихание, заложенность носа, снижение активности, ухудшение аппетита. Если процесс затрагивает мочевыделительная система, возможно появление частые позывы в лоток, кровь в моче или болезненность при мочеиспускании. У котят заболевание может проходить тяжелее и быстрее приводить к обезвоживанию.

Когда страдает дыхательная система нередко напоминает обычную простуду: кошка чихает, у неё текут слёзы, появляются выделения из носа. Однако при микоплазмозе симптомы могут затягиваться и повторяться после временного улучшения. Именно поэтому ставить диагноз самостоятельно только по внешнему виду нельзя считать надёжным: сходные проявления встречаются и при других инфекциях.

Как диагностируют и лечат микоплазмоз

Чтобы уточнить, что причина действительно связана с микоплазмой, ветеринар может назначить лабораторные исследования: ПЦР-тест, бактериологический посев или цитологию. Существенно, что обнаружение микоплазмы не всегда автоматически означает, что она является основной причиной болезни: у здоровых кошек эти микроорганизмы тоже иногда находят. По этой причине терапию подбирают комплексно, принимая во внимание всю клиническую картину и результаты обследования.

1. Обратиться к ветеринарному врачу при первых признаках
2. Сдать рекомендованные анализы
3. Не применять антибиотики самостоятельно
4. Создать кошке спокойные условия и доступ к питью
5. Соблюдать гигиену при уходе

Антибактериальные препараты применяются только по назначению ветеринара, поскольку неправильно подобранный препарат может не помочь, а может навредить. Курс терапии нужно доводить до конца, даже когда кошке стало лучше. Одновременно врач может рекомендовать поддерживающие процедуры: промывание глаз, увлажнение воздуха, витаминные добавки.

Профилактика и защита людей в доме

Хотя вероятность заражения человека невелика, имеет смысл придерживаться несложные правила гигиены. Мойте руки после общения с кошкой, в особенности после уборки лотка или обработки глаз. Если в доме есть люди с ослабленным иммунитетом, лучше выделить отдельные миски и полотенца для питомца. Регулярная дезинфекция лежанки и лотка также будет полезной.

Если у кошки подтверждён микоплазмоз, постарайтесь ограничить её контакты с маленькими детьми и людьми с иммунодефицитом на время лечения. Это не означает, что надо запирайте животное в отдельной

комнате — [ветеринарные услуги в Москве](#) достаточно не разрешать спать на подушке или есть с общей посуды. Когда кошка поправится, риск снижается, но привычка к гигиене полезна в любом случае.

Заключение

Кошачий микоплазмоз — не приговор и не непосредственная опасность для здорового человека. Микоплазмы, встречающиеся у кошек, обычно не передаются людям и не вызывают у них болезней при нормальной работе иммунной системы. Основная задача владельца — вовремя заметить симптомы, обратиться к специалисту и соблюдать элементарные правила гигиены.

Часто задаваемые вопросы

Микоплазмоз у кошек передаётся человеку?

Кошачьи виды микоплазм, как правило, не являются возбудителями болезней человека. Риск заражения для здорового человека расценивается как невысокая. Тем не менее людям с ослабленным иммунитетом стоит соблюдать осторожность и не забывать о гигиене.

Как проявляется микоплазмоз у кошек?

Обычно отмечаются выделения из глаз, чихание, насморк, вялость, ухудшение аппетита. Если затрагивается мочевыделительная система возможны частые позывы, примесь крови в моче. Признаки могут напоминать другие инфекции, поэтому важна точная диагностика.

Как выявляют микоплазмоз у кошек?

Ветеринар может порекомендовать ПЦР-тест, бактериологический посев или цитологию. Обнаружение микоплазмы не всегда говорит о том, что именно она стала причиной болезни, так как эти микроорганизмы иногда обнаруживают и у здоровых кошек.

Как лечат микоплазмоз у кошек?

Лечение назначает только ветеринарный врач. Как правило, используют антибактериальные препараты, поддерживающие процедуры и уход. Не нужно давать кошке лекарства самостоятельно, это может навредить питомцу.

Нужно ли изолировать кошку с микоплазмозом от людей?

Если в доме есть люди с ослабленным иммунитетом, маленькие дети или те, кто проходит иммуносупрессивную терапию, имеет смысл свести к минимуму тесный контакт на время лечения. Это не означает, что нужна полная изоляция, будет достаточно соблюдать гигиену и не допускать контакта с выделениями.

Можно ли заразиться микоплазмозом от кошки через укус или царапину?

Прямая передача кошачьего микоплазмоза через укус или царапину не считается типичным путём. Однако любая рана нуждается в обработке и внимании, чтобы избежать других инфекций.