Mycoplasma у кошек: симптомы, выявление и что делать

Микоплазмоз у кошек — это бактериальное заболевание, которое провоцируют микроорганизмы рода Mycoplasma. Обычно они затрагивают органы дыхания, конъюнктиву и мочеполовую систему. Многие владельцы сталкиваются с ней неожиданно, когда кошка начинает часто дышать, у кота отказывают задние лапы или моча окрашивается кровью.

Возбудитель способен длительно сохраняться на слизистых оболочках без явных симптомов, а патология проявляется при снижении иммунитета. Стоит помнить, что заключение устанавливает специалист по результатам анализов, а самолечение опасно для питомца. Если есть подозрение на Mycoplasma стоит вызвать ветеринара на дом.

## Микоплазмоз у кошек: общее представление

Mycoplasma — это мельчайшие микроорганизмы, у которых отсутствует жёсткой клеточной стенки. Их обнаруживают на слизистых оболочках дыхательных путей, конъюнктивы и мочевыводящих путей как у больных, так и у клинически здоровых питомцев. Патология возникает не у всех носителей, а когда складываются предпосылки: стресс, холод, вирусная нагрузка или другие факторы, ослабляющие защитные силы организма.

Микоплазмоз не всегда развивается изолированно. Часто он сочетается с кальцивирусной инфекцией, герпесвирусом или другими респираторными заболеваниями. По этой причине ветеринар оценивает не только наличие микоплазмы, но и общее состояние животного.

## Симптомы микоплазмоза у кошек

Симптомы микоплазмоза определяются от того, какие органы вовлечены. Когда страдают органы дыхания, кошка может часто дышать, издавать хрипы, чихать или кашлять. При поражении глаз возникают слезотечение, покраснение и слизистые выделения из глаз. Когда задеты мочевыводящие пути, хозяин может заметить кровь в моче, частое посещение лотка или болезненное мочеиспускание.

- Выделения из носа и затруднённое носовое дыхание
- Воспаление слизистой глаз, слёзные дорожки
- Апатия, снижение аппетита
- Лихорадка — не всегда
- Кровь в моче, поллакиурия
- Хромота, слабость задних лап

Особенно настораживают резкие перемены: кошка перестаёт есть, у животного начинается рвота или понос, возникает одышка. Если у питомца перестают работать задние лапы или он не встаёт, такое состояние требует срочной ветеринарной помощи. Не нужно ждать — стоит вызвать врача на дом.

## Как диагностируют микоплазмоз

Диагностика микоплазмоза включает несколько этапов. Сначала специалист оценивает животное, собирает анамнез и симптомы. Затем иногда потребоваться лабораторные исследования: полимеразная цепная реакция для обнаружения генетического материала, микроскопия мазков или бактериологический

посев. Важно, что обнаружение микоплазмы не обязательно подтверждает, что именно она стала причиной болезнь — заключение трактуют в сочетании с симптомами.

МетодНа что направленПЦРПрисутствие генетического материала возбудителяМикроскопияКлеточный составБактериологический посевРост колонийОАКВоспалительные измененияБиохимия кровиФункция печени и почек

Лишь ветеринарный врач способен корректно расшифровать данные и подобрать терапию. Не пытайтесь самому давать антибиотики — это способен изменить картину и ухудшить состояние животному.

## Как лечат микоплазмоз

Лечение микоплазмоза должно быть комплексным и назначаться ветеринаром. Основу обычно образуют антибактериальные средства, к которым микоплазма восприимчив. Однако не все препарат работают — ряд могут быть бесполезными по причине отсутствия клеточной оболочки у возбудителя. Именно поэтому подбор препарата должен осуществлять врач.

Кроме того могут использоваться симптоматические меры: капельницы при обезвоживании, жаропонижающие (с осторожностью), витамины и иммуномодуляторы. Существенно обеспечить животному покой, комфортное место и доступ к питью. Если питомец не хочет есть, иногда нужно принудительное кормление или инфузия.

Ни в коем случае не давайте кошке *круглосуточный ветврач на дом* людские лекарства без назначения. Ряд из них способны оказаться токсичными для кошек — например, ацетаминофен и ибупрофен опасны. В любом случае спрашивайте у ветеринара, чем можно помочь питомцу.

## Профилактика и что делать при подозрении

Предупреждение заболевания включает сохранение защитных сил, полноценное кормление, регулярные осмотры к специалисту и обработку от блох и клещей. Стресс, переохлаждение и контакт с больными животными могут повышать вероятность развития болезни. Если дома появился новый кот, его нужно продемонстрировать врачу и при необходимости сдать обследование.

1. Отделите питомца от других животных, когда есть признаки заболевания
2. Свяжитесь с ветеринарным специалистом и опишите симптомы
3. Не применяйте лекарства без назначения
4. Создайте животному тишину и свободный доступ к питью
5. Выполняйте рекомендации специалиста и не прерывайте терапию самостоятельно

Когда у питомца появились опасные признаки — одышка, конвульсии, кровяные выделения в моче, отсутствие поддержки задних конечностей — нужно незамедлительно связаться за поддержкой специалиста. Задержка способна привести к тяжёлым последствиям.

## Уход за кошкой при микоплазмозе

Забота за кошкой с заболеванием включает создание спокойных условий. Питомцу необходим покой, тёплое место и отсутствие волнений. Если присутствуют выделения из глаз или носа, их аккуратно удаляют ватным диском, смоченным кипячёной водой или физиологическим раствором. Также необходимо следить за аппетитом и питьевым режимом.

Если кошка отказывается есть более одного дня, это способно оказаться угрожающим. В подобном случае следует сказать специалисту. Кормление обязана быть лёгкой и питательной — можно применять специализированные рационы для ослабленных кошек или мягкую пищу по назначению врача.

## Заключение

Mycoplasma-инфекция у питомцев — серьёзное заболевание, которое нуждается в внимательного подхода и своевременной диагностики. Не стоит практиковать самолечением или откладывать визит к ветеринару. Когда у кошки появились тревожные признаки, стоит незамедлительно обратиться за профессиональной помощью.

Помните, что правильный уход, ***вызов ветеринара круглосуточно москва*** поддержка иммунитета и соблюдение рекомендаций врача помогают питомцу быстрее восстановиться и вернуться к обычной жизни. Мы всегда готовы помочь — обращайтесь.

## Часто задаваемые вопросы

### Может ли человек заразиться микоплазмозом от кошки?

Некоторые виды микоплазм могут быть опасны для людей, однако кошачьи штаммы, как обычно, не передаются человеку. Однако следует соблюдать гигиену: мыть руки после взаимодействия с питомцем, особенно если у кошки есть выделения или повреждения.

### Микоплазмоз лечится навсегда?

Полное удаление от микоплазмы не всегда возможно, так как некоторые кошки становятся носителями. Но корректное лечение помогает снять симптомы и улучшить качество жизни животного. Ключевое — своевременно обратиться к специалисту и соблюдать назначения.

### Когда появляются первые признаки?

Инкубационный период способен составлять от нескольких дней до недель. Симптомы могут появиться постепенно или внезапно, особенно если иммунитет снижен. Иногда патология протекает без выраженных симптомов.

### Можно ли делать прививку от микоплазмоза?

Отдельной вакцины против микоплазмоза на данный момент не существует. Предупреждение заключается к поддержанию иммунитета, полноценному питанию, регулярным осмотрам у ветеринара и снижению стрессовых факторов.

### Передаётся ли микоплазмоз от кошки к собаке или другим животным?

Микоплазмы обладают видоспецифичностью, это значит кошачьи штаммы, как обычно, не опасны для собак и других животных. Однако различные виды микоплазм могут поражать разных животных, поэтому при подозрении на инфекцию лучше отделить питомца и проконсультироваться с ветеринаром.

### Какие анализы нужно сдать для диагностики микоплазмоза?

Как правило ветеринар рекомендует ПЦР (полимеразную цепную реакцию) для выявления ДНК возбудителя, цитологическое исследование мазков и, при необходимости, бактериологический посев.

Также могут понадобиться общий и биохимический анализы крови для оценки общего состояния питомца. Точный перечень определяет врач по клинической картине.